

供应问题: 液体 paracetamol

(读音:帕拉西塔莫)



液体 paracetamol 常用于缓解发烧和疼痛症状，主要用于儿童。
从2022年9月1日起，获得资助的液体 paracetamol (Paracare) 供应将会受到影响。为确保持续供应，Paracare 将被一个名为 Avallon 的新品牌取代。

Avallon paracetamol 有何不同?

5 毫升中 120 毫克 (低规格)

颜色和口味有所不同。Avallon为类白色，有草莓/香草口味。

5 毫升中 240 毫克 (高规格)

- 5 毫升中 240 毫克与 Paracare Double Strength (5 毫升中 250 毫克) 的剂量有所不同。这意味着您孩子服用的药物剂量可能会改变。
请参阅下页的剂量表。
- 此规格也为类白色，有草莓/香草口味。



Avallon paracetamol 两种规格的颜色和口味相同。

请您务必阅读标签，以便给您孩子正确剂量。不要依靠颜色、气味或味道。

如果您不能确定给药剂量，请咨询您的家庭医生、护士或药剂师。



备注

非活性成分，例如口味添加剂、着色剂和糖分等可能会有所不同。
如果您对此有任何疑问，请咨询您的家庭医生、护士或药剂师。



Avallon 5 毫升中 240 毫克未经 Medsafe 批准

尽管其已在澳大利亚获得批准，但 Avallon 5 毫升中 240 毫克尚未通过新西兰 Medsafe 的审批流程，这并不意味着药物不安全。

我应该给孩子多大剂量的 paracetamol?

- Paracetamol 剂量取决于孩子的体重。
- 请测量孩子的体重，并检查您的 paracetamol 的规格。
- 请使用下面的剂量表选择正确的剂量。

在给您的孩子服用 paracetamol 之前:

- 确认您的孩子是否仍然需要此药物。
- 两次给药之间至少间隔4小时。
- 24小时内给药**不得超过**4剂。
- 检查药物的有效期。

! 孩子的服用剂量不得超过每日推荐剂量。
如果孩子服用剂量过大，无论是一次性服用还是多日服用，paracetamol 都会伤害他们的肝脏。

Paracetamol 剂量表

孩子的体重	5 毫升中 120 毫克	5 毫升中 250 毫克	5 毫升中 240 毫克 (新规格)
不到 5 千克	请咨询您的家庭医生 或药剂师	请咨询您的家庭医生 或药剂师	请咨询您的家庭医生 或药剂师
5 千克	3 毫升	1.5 毫升	1.5 毫升
6 至 7 千克	3.5 毫升	1.5 毫升	1.5 毫升
8 至 9 千克	5 毫升	2 毫升	2 毫升
10 至 12 千克	6 毫升	3 毫升	3 毫升
13 至 14 千克	8 毫升	4 毫升	4 毫升
15 至 16 千克	9.5 毫升	4.5 毫升	4.5 毫升
17 至 18 千克	10.5 毫升	5 毫升	5 毫升
19 至 20 千克	12 毫升	5.5 毫升	6 毫升
21 至 22 千克	13 毫升	6.5 毫升	6.5 毫升
23 至 25 千克	14.5 毫升	7 毫升	7 毫升
26 至 28 千克	16.5 毫升	8 毫升	8 毫升
29 至 32 千克	18 毫升	8.5 毫升	9 毫升
33 至 36 千克	20.5 毫升	10 毫升	10 毫升
37 至 41 千克	23 毫升	11 毫升	11.5 毫升
42 至 60 千克	26 毫升	12.5 毫升	13 毫升
超过 60 千克	30 至 40 毫升	15 至 20 毫升	15 至 20 毫升